

# Astrónoma descubre método para calcular rotación de agujeros negros

05 de Febrero 2015, 10:36 pm



La astrónoma chilena **Paulina Lira** dio a conocer los detalles de la investigación llevada a cabo recientemente para elaborar el código que ha permitido calcular la rotación de los **agujeros negros**.

Lira, miembro del departamento de [Astronomía de la Universidad de Chile](#) , explicó que la investigación requirió 80 horas de observación de agujeros negros captados por el **Very Large Telescope (VLT)**, situado en el observatorio de **Cerro Paranal**, en la desértica región de Antofagasta.

- **LEE AQUÍ: [Mira en este video cómo se forma un agujero negro](#)**

El estudio, publicado recientemente en la revista británica [Monthly Notices of Royal Astronomy Society](#) , duró un año e incluyó el análisis de 40 agujeros negros o quásares de galaxias lejanas, cuando el universo tenía un 20 % de su actual antigüedad.

[attach\_entity|type=inline\_element|id=43666]

Los agujeros negros son la concentración de densidad más grande que existe, lo que significa que todo el material que contiene está comprimido hasta el infinito, a pesar de lo cual ocupan apenas un punto en el universo.

"Tal magnitud de masa no permite a ningún objeto que se encuentre cercano escapar a su campo gravitatorio, absorbiendo todo a su paso, incluso la luz, lo que los hace completamente negros", explicó Lira.

- **LEE AQUÍ: [Descubren tres gigantes agujeros negros a 4.000 millones años luz](#)**

La astrónoma chilena señaló que los agujeros negros "son objetos súper simples que están caracterizados por su masa y su estado de rotación, elemento este que ha sido muy difícil de poder medir".

Lo que Lira y su equipo hicieron fue estudiar el comportamiento de todo el

material incandescente que se aproxima a caer dentro de los agujeros negros, y que los hace crecer eternamente.

El cálculo de la rotación de los agujeros negros "permite entender cómo han ido creciendo paralelamente a la vida del universo y por qué llegan a tener estas masas gigantescas", agregó.

- **LEE AQUÍ: *Telescopio refuta teoría de la "rosquilla" sobre los agujeros negros***

El estudio de la científica, llamado "**Active Galactic Nuclei at z-1.5: I.Spectral energy distribution and accretions discs**", es un análisis de los resultados de los primeros 30 quásares.

"Nos falta aún estudiar los últimos 10. La idea es expandir la investigación a muestras mucho más grandes, para saber qué más se puede aprender de ellos", detalló.

Además de Lira, doctora en Astronomía de la Universidad de Edimburgo, el equipo de investigación astrofísica que calculó la rotación de los agujeros negros estuvo compuesto por los científicos **Dan Capellupo y Benny Trakhtenbrot**, junto con Hagai Netzer, de la **Universidad de Tel Aviv**.