

Estrellas

Simón Casassus


Astronomía, Universidad de Chile

<http://www.das.uchile.cl/~simon>

- I Transfer Radiativo
- II Propiedades generales
- III Atmósferas estelares
- IV Interiores estelares
- V Evolución estelar

Part III

Atmósferas estelares



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas


- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

Definición

- La atmósfera estelar es la región externa de la estrella, hasta una profundidad óptica de $\tau_\nu \sim 10^3$, para una frecuencia ν en el continuo lejos de líneas espectrales.
- La estructura radial de las condiciones físicas en la estrella, es decir T , la densidad ρ , y las abundancias de las principales especies (n_e , n_{HII} , n_{H^-} , n_{HI} , n_{HeII} , n_{HeI} , n_{CO} , etc...), determinan el transporte radiativo desde el interior de la estrella hasta su superficie.
- En la atmósfera no hay generación neta de luminosidad, es decir está lejos de las regiones donde ocurre la fusión nuclear.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Definición

- La base de la atmósfera es ópticamente gruesa (en el extremo), y su profundidad es la necesaria para poder reproducir el espectro observado, en todas las frecuencias observadas, en base al transfer radiativo a través de la estructura radial de la atmósfera.
- \Rightarrow la física de la atmósfera estelar es crucial en la interpretación de los espectros estelares, para medir:
 - estructura en densidad y presión, y, por equilibrio hidrostático, la aceleración gravitacional local. \Rightarrow conduce a una medida del radio y de la masa estelar.
 - la composición química de la estrella.
- La profundidad lineal entre la base de la atmósfera y la fotosfera es a lo más $\sim 1\%$ del radio de la fotosfera, por lo que la geometría plano-paralela es adecuada para describir una atmósfera.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

1 La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

2 Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

3 Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones


4 Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura


- En una atmósfera gris imponemos que la opacidad es independiente de la frecuencia, i.e. $\kappa_\nu = \kappa$.
- La ecuación de transfer en geometría plano-paralela es

$$\mu \frac{\partial I_\nu}{\partial \tau_\nu} = I_\nu - S_\nu. \quad (1)$$

- Integrando en frecuencia,

$$\mu \frac{\partial I}{\partial \tau} = I - S, \quad (2)$$

con $I = \int_0^\infty I_\nu d\nu$ y $S = \int_0^\infty S_\nu d\nu$.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura


- En equilibrio radiativo, es decir en estado estacionario y en ausencia de otras fuentes de energía, todo lo que es absorbido localmente (i.e. en un elto de volumen dV) es igual a todo lo emitido, es decir

$$\int_0^\infty d\nu \oint d\Omega \kappa_\nu I_\nu \rho dV = \int_0^\infty d\nu \oint d\Omega j_\nu \rho dV, \quad (3)$$

en que j_ν es el coeficiente de emisión por unidad de masa y volumen (i.e. en W kg^{-1}).

- Como $S_\nu = j_\nu / \kappa_\nu$, para opacidades grises tenemos, de Ec. 3, que $J = S$.
- Para procesos termales, en un régimen cercano a LTE y lejos de la superficie, el campo de radiación I_ν es cercano a la función de Planck, y $S_\nu \approx B_\nu$.
- Tenemos finalmente que

$$J(\tau) = S(\tau) \approx B(\tau) = \int_0^\infty d\nu B_\nu(\tau) = \frac{\sigma T^4(\tau)}{\pi} \quad (4)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura

- Seguimos ahora con un desarrollo análogo al de la aproximación de Eddington para obtener $J(\tau)$ y por ende $T(\tau)$. Partimos por promediar Ec. 2 en direcciones (momento 0):

$$\frac{1}{4\pi} \oint d\Omega \mu \frac{\partial I}{\partial \tau} = \frac{1}{4\pi} \oint d\Omega I - \frac{1}{4\pi} \oint d\Omega S. \quad (5)$$


- Tenemos entonces

$$\frac{\partial H}{\partial \tau} = J - S, \quad (6)$$

con H momento 1 de I (también llamado flujo de Eddington).

- Vemos entonces que en equilibrio radiativo, $J = S$ y $\frac{\partial H}{\partial \tau} = 0$, es decir el flujo es constante dentro de la atmósfera. Esto era de esperar en la ausencia de fuentes de energía, y cuando el único sumidero es radiación por la superficie.
- El flujo es igual al emergente por la superficie, i.e.

$$H = \frac{\sigma T_{\text{eff}}^4}{4\pi} \quad (7)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura

- Ahora tomamos el momento 1 de Ec. 2, es decir

$$\frac{1}{4\pi} \oint d\Omega \mu^2 \frac{\partial I}{\partial \tau} = \frac{1}{4\pi} \oint d\Omega \mu I - \frac{1}{4\pi} \oint d\Omega \mu S. \quad (8)$$

- Tenemos entonces

$$\frac{\partial K}{\partial \tau} = H, \quad (9)$$

donde $K = \int d\nu K_\nu$ es el momento 2 de I_ν .

- Como $H(\tau)$ es constante, integramos trivialmente Ec. 9:


$$K(\tau) = H\tau + C, \quad (10)$$

donde C es una constante de integración.

- Aplicamos ahora la aproximación de Eddington, $J = 3K$, y obtenemos

$$J(\tau) = 3(H\tau + C). \quad (11)$$

(para recordar $J = 3K$, ver Ejemplo 4.1 de Leblanc: calcular K y J si $I = I_0$ para $\mu > 0$ y $I = I_1$ para $\mu < 1$).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura

- En LTE $J = \int d\nu B_\nu = \frac{\sigma T^4}{\pi}$, y como $H = \frac{\sigma T_{\text{eff}}^4}{4\pi}$,

$$T(\tau) = T_{\text{eff}} \left(\frac{3}{4}(\tau + y) \right)^{1/4}, \quad (12)$$

donde $y = C/H$.


- Ahora imponemos la condición que el flujo emergente debe provenir de la región donde la probabilidad de escape de la radiación es al menos $\sim 50\%$, correspondiente a una opacidad τ_0 :

$$e^{-\tau_0} = \frac{1}{2}, \quad \rightarrow \tau_0 \approx \frac{2}{3}. \quad (13)$$

- Bajo el supuesto que $T(\tau_0) \approx T_{\text{eff}}$, tenemos que $y = 2/3$, y

$$T(\tau) = T_{\text{eff}} \left[\frac{3}{4} \left(\tau + \frac{2}{3} \right) \right]^{1/4}, \quad (14)$$

$$J(\tau) = 3H \left[\tau + \frac{2}{3} \right]. \quad (15)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

1.1- Perfil radial de temperatura

- Comparación entre un perfil de atmósfera para $T_{\text{eff}} = 10000 \text{ K}$ y $\log(g) = 4$, y composición solar (línea sólida), con el perfil de una atmósfera gris y la misma T_{eff} (línea punteada), como función de la profundidad óptica a 5000 \AA (figura reproducida de Leblanc).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

1 La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

2 Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

3 Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones


4 Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar



Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.2- “Limb-darkening”

- Aplicación: oscurecimientos de borde (*limb darkening*).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar



Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.2- “Limb-darkening”

- Otro ejemplo en Jupiter (notar magnificación de Ganymedes).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar



Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.2- "Limb-darkening"

- Interpretación cualitativa para limb-darkening:



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.2- “Limb-darkening”


- Estimemos el limb-darkening con la atmósfera gris.
- Partimos con la solución formal de la ecuación de transfer, vista en Cap. A, pero aplicada a la geometría plano-paralela (ver desarrollo en Sec. 3.6 de Leblanc):

$$I_{\nu}(\tau_{\nu,1}, \mu) = I_{\nu}(\tau_{\nu,2}, \mu) e^{\frac{\tau_{\nu,1} - \tau_{\nu,2}}{\mu}} + \int_{\tau_{\nu,1}}^{\tau_{\nu,2}} S_{\nu}(t) e^{\frac{\tau_{\nu,1} - t}{\mu}} \frac{dt}{\mu}, \quad (16)$$

donde $I_{\nu}(\tau_{\nu,1}, \mu)$ es la intensidad en el punto donde la profundidad óptica, integrada verticalmente desde la superficie, es $\tau_{\nu,1}$, y en dirección μ , y similarmente para el punto más profundo $\tau_{\nu,2}$.

- En la superficie, $\tau_{\nu,1} = 0$, y si integramos profundo entonces llevamos $\tau_{\nu,2} \rightarrow \infty$, con lo que ya no es relevante el valor de $I_{\nu}(\tau_{\nu,2}, \mu)$:

$$I_{\nu}(0, \mu) = \int_0^{\infty} S_{\nu}(t) e^{-\frac{t}{\mu}} \frac{dt}{\mu}. \quad (17)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.2- “Limb-darkening”


- Para la atmósfera gris, vemos que $J = S$, y usando Ec. 15:

$$\begin{aligned} I(0, \mu) &= \int_0^\infty S(t) e^{-\frac{t}{\mu}} \frac{dt}{\mu} = \int_0^\infty 3H \left[t + \frac{2}{3} \right] e^{-\frac{t}{\mu}} \frac{dt}{\mu} \\ &= 3H \left[\mu + \frac{2}{3} \right]. \end{aligned} \quad (18)$$

- Podemos ahora comparar la intensidad emergente en la superficie en dirección normal con la de una dirección arbitraria μ :

$$R(\mu) = \frac{I(0, \mu)}{I(0, \mu = 1)} = \frac{3}{5} \left[\mu + \frac{2}{3} \right]. \quad (19)$$

- Vemos entonces que $R = 0.4$ en el borde del disco estelar, donde $\mu = 0$.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

1 La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

2 Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

3 Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones


4 Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar


Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.3- Espectro emergente

- Para obtener el espectro emergente $H_\nu(0)$ usamos nuevamente la solución formal de la ecuación de transfer, Ec. 16 (tarea, con opacidades grises):

$$H_\nu(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \mu I_\nu(\tau, \mu) d\mu =$$
$$\underbrace{\frac{1}{2} \int_{-1}^0 d\mu \mu \left[\int_0^\tau S_\nu(t) e^{-\frac{\tau-t}{\mu}} \frac{dt}{\mu} \right]}_{\text{flujo proveniente desde el exterior al punto } \tau} +$$
$$\underbrace{\frac{1}{2} \int_0^1 d\mu \mu \left[\int_\tau^\infty S_\nu(t) e^{-\frac{\tau-t}{\mu}} \frac{dt}{\mu} \right]}_{\text{flujo proveniente desde el interior al punto } \tau} . \quad (20)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

1.3- Espectro emergente

- En términos de las funciones 'integrales exponenciales',


$$E_n(x) = \int_1^{\infty} e^{-xy} \frac{dy}{y^n}, \quad (21)$$

la Ec. 20 se escribe:

$$H_{\nu}(\tau) = \frac{1}{2} \int_0^{\tau} S_{\nu}(t) E_2(\tau - t) dt - \frac{1}{2} \int_{\tau}^{\infty} S_{\nu}(t) E_2(\tau - t) dt. \quad (22)$$

- Como $S_{\nu} = B_{\nu}(T)$, usamos el perfil radial de temperatura Ec. 14 para calcular

$$H_{\nu}(\tau) = \frac{1}{2} \int_0^{\tau} B_{\nu}(T(t)) E_2(\tau - t) dt - \frac{1}{2} \int_{\tau}^{\infty} B_{\nu}(T(t)) E_2(\tau - t) dt. \quad (23)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías


1.3- Espectro emergente

- Cálculo numérico (figura reproducida de Leblanc):



En esta figura $\alpha = \frac{h\nu}{kT_{\text{eff}}}$.

- Demostrar que $\lim_{\tau \rightarrow \infty} H_\nu(\tau) = \pi B_\nu$ (tarea).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas

- Vimos en el Cap. A que el acoplamiento radiativo de medios discretos se describe usando los coeficientes de Einstein, y que el coeficiente de absorción es

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} (n_i B_{ij} - n_j B_{ji}) \phi(\nu), \quad (24)$$


donde $\phi(\nu)$ es el perfil de la línea.

- Para un blanco en reposo y aislado, el perfil de líneas es el perfil natural, o sea es una Lorentziana:

$$\phi(\nu) = \frac{\frac{\Gamma_{ij}}{4\pi^2}}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Gamma_{ij}}{4\pi}\right)^2} \quad (25)$$

donde

$$\Gamma_{ij} = \sum_{k < j} A_{jk} + \sum_{k < i} A_{ik}. \quad (26)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Perfil de Voigt

- En un gas en LTE las partículas siguen la distribución de Maxwell-Boltzmann, con una densidad de probabilidad en velocidad a lo largo de una línea de visión dada por


$$f(u) = \frac{1}{\sigma_u \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma_u^2}}, \quad (27)$$

donde $\sigma_u = \sqrt{\frac{kT}{m}}$.

- Entonces por corrimiento Doppler el coeficiente de absorción suma las contribuciones de cada velocidad, es decir:

$$\alpha(\nu) = \int du \alpha_o \left(\nu - \nu \frac{u}{c} \right) f(u) du, \quad (28)$$

donde α_o es el coeficiente de absorción sin tomar en cuenta el ancho térmico.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Perfil de Voigt

- El coeficiente de absorción de un gas tiene entonces un perfil de línea


$$\phi(\nu) = \int du \frac{1}{\sigma_u \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma_u^2}} \frac{\frac{\Gamma_{ij}}{4\pi^2}}{(\nu - \nu \frac{u}{c} - \nu_o)^2 + \left(\frac{\Gamma_{ij}}{4\pi}\right)^2}, \quad (29)$$

lo cual representa la convolución entre la distribución de velocidades y la Lorentziana.

- Con el siguiente cambio de variables: $\Delta\nu_D = \nu_o \sqrt{2} \frac{\sigma_u}{c}$, $\nu = \frac{u - \sqrt{2}\sigma_u}{\Delta\nu_D}$ y $a = \frac{\Gamma_{ij}}{4\pi\Delta\nu_D}$, el perfil de línea también se escribe (**tarea**):

$$\phi(\nu) = \frac{a}{\Delta\nu_D \pi^{3/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{(v - y)^2 + a^2} dy. \quad (30)$$

El perfil en Ec. 30 es el 'perfil de Voigt'.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Perfil de Voigt

- Ejemplos de perfiles de líneas (figura reproducida de Leblanc):



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas




Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Perfil de Voigt

- Ejemplos de espectros estelares para dos estrellas con mismo T_{eff} pero distintas rotaciones $v \sin(i)$ (figura reproducida de Leblanc):



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas


- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Ancho de presión

- El campo eléctrico promedio en el plasma estelar representa una perturbación en los niveles de energía de los átomos e iones. Este efecto, conocido como 'efecto Stark', es más importante para los átomos 'grandes', con tamaños típicos de la nube electrónica suficientemente grandes para que el campo eléctrico de fondo no sea despreciable ante el campo nuclear.
- La perturbación de los niveles electrónicos conduce a un ancho adicional de línea, que entra en el perfil de Voigt como un aumento de la constante Γ_{ij} (aumenta el número de sumandos en la Ec. 26).
- El efecto Stark tendrá un impacto más grande mientras más denso el plasma. Es una medida de la densidad o presión local, y por equilibrio hidrostático es una medida de $\log(g)$.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.1- Perfiles de líneas- Ancho de presión

- El ancho de presión es más importante mientras más compacta la estrella, como se ilustra en este ejemplo que compara dos estrellas A ($T_{\text{eff}} = 10000$ K), con una en la secuencia principal ($\log(g) = 4$) y la otra una super-gigante ($\log(g) = 2$).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías


2.2- Líneas estelares

- Para medir la fuerza de una línea estelar, con espectro $F(\lambda)$, o en general de líneas de ‘absorción’ relativas a un continuo $F_c(\lambda)$ en ausencia de línea, se suele usar el ancho equivalente:

$$W_\lambda = \int d\lambda \left[1 - \frac{F_\lambda}{F_c} \right]. \quad (31)$$

- Una medida de la profundidad de una línea es su atenuación:

$$A_\lambda = \frac{F_c - F_\lambda}{F_c}. \quad (32)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.2- Líneas estelares

- Considerando que el grueso de la radiación emana de la superficie con $\tau_\lambda = \frac{2}{3}$,

$$A_\lambda \approx \frac{B_\lambda(\tau_c = \frac{2}{3}) - B_\lambda(\tau_\lambda = \frac{2}{3})}{B_\lambda(\tau_c = \frac{2}{3})}, \quad (33)$$


en que hemos distinguido dos profundidades ópticas τ_c y τ_λ correspondientes a las opacidades de continuo solamente, κ_c , y de continuo más línea, $\kappa_\lambda = \kappa_c + \kappa_l$.

- Para líneas débiles, el aumento de opacidad $\Delta\tau$ bajo la línea, $\Delta\tau = \tau_\lambda - \tau_c \ll 1$, y expandimos

$$B_\lambda(\tau_\lambda = \frac{2}{3}) \approx B_\lambda(\tau_c = \frac{2}{3}) + \left. \frac{\partial B_\lambda}{\partial \tau_c} \right|_{\tau_c = \frac{2}{3}} \Delta\tau. \quad (34)$$

- Entonces, para líneas ópticamente delgadas,

$$A_\lambda \approx -\frac{1}{B_\lambda} \left. \frac{\partial B_\lambda}{\partial \tau_c} \right|_{\tau_c = \frac{2}{3}} \Delta\tau. \quad (35)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

2.2- Líneas estelares

- Podemos expresar $\Delta\tau$ en función de κ_I y κ_C . Partimos considerando que

$$\tau_C = \tau_\lambda \frac{\kappa_C}{\kappa_I + \kappa_C}, \quad (36)$$

y como $\tau_\lambda = \frac{2}{3}$ en el centro de la línea,


$$\tau_C = \frac{2}{3} \frac{\kappa_C}{\kappa_I + \kappa_C}, \quad (37)$$

y

$$\Delta\tau = \tau_C - \frac{2}{3}. \quad (38)$$

- Usando la Ec. 37, la Ec. 35 se puede simplificar cuando $\kappa_I \ll \kappa_C$, por ejemplo para especies muy enrarecidas:

$$A_\lambda \approx \frac{2}{3} \frac{\kappa_I}{\kappa_C} \frac{1}{B_\lambda} \left. \frac{\partial B_\lambda}{\partial \tau_C} \right|_{\tau_C = \frac{2}{3}}. \quad (39)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar



Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

2.2- Líneas estelares

- La profundidad de la línea se satura cuando la abundancia de la especie es suficientemente grande para que $\tau_\lambda = \frac{2}{3}$ donde $\tau_c \approx 0$. Entonces el ancho equivalente de la línea sigue creciendo por ancho de presión.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

"Limb-darkening"

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.1- Algoritmo ejemplo

- Para interpretar un espectro estelar observado lo comparamos con espectros sintéticos, producido por la solución de la ecuación de transfer en una atmósfera modelo.
- Los ingredientes que caracterizan una atmósfera en el modelo son: T_{eff} , $\log(g)$, las abundancias de todas las especies que componen la atmósfera, $\{X_i\}_{i=1}^A$, y los datos atómicos necesarios para calcular las opacidades de continuo y de las líneas.
- Podemos hacer una primera estimación del perfil radial de temperatura $T(\tau)$, por ejemplo usando una atmósfera gris y usando la opacidad de Rosseland $\kappa_R(T_{\text{eff}})$ para relacionar τ con la profundidad en la estrella.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares


Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.1- Algoritmo ejemplo

- Con estos ingredientes ya conocidos, un algoritmo ejemplo (descrito en detalle en Leblanc) procede con un método iterativo, en que cada iteración empieza por calcular $P(\tau)$ usando la ecuación de equilibrio hidrostático para obtener $P(\tau)$:

$$-\frac{\partial P}{\partial r} = g \Leftrightarrow \frac{\partial \ln(P)}{\partial \ln(\tau)} = \frac{g\tau}{\kappa P}. \quad (40)$$

- Con las densidades locales dadas por $P(\tau)$ y $T(\tau)$ y $\{X_i\}_{i=1}^A$, se procede con resolver las ecuaciones de Saha (que forman un set de ecuaciones acopladas por la densidad de electrones, n_e). Luego se estima la ocupación de los niveles de energía usando la estadística de Boltzman en LTE.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

3.1- Algoritmo ejemplo

- Las condiciones físicas locales y los datos atómicos se usan para calcular la opacidad total del plasma estelar $\kappa_{\nu}(\tau)$. Por ejemplo, en el caso del Sol, resulta que la fuente principal de opacidad es el ion H^{-} . En la figura de la slide siguiente (extraída de Bohm-Vitense) se grafica $\kappa_{\nu}(\tau)$ para el continuo, en el caso de $\theta = 5040/T = 0.9$, o sea $T_{\text{eff}} = 5600 \text{ K}$, y $\log(P_e/\text{cgs}) = 1.0$.
- Con las opacidades, la ecuación de transfer queda completamente determinada, y se puede resolver numéricamente o bien usando la aproximación de Eddington, con condiciones de bordes aproximadas.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones



Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

3.1- Algoritmo ejemplo



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.1- Algoritmo ejemplo


- Una vez conocido I_ν en todo τ , comparamos $\int_0^\infty H_\nu d\nu$ con σT_{eff}^4 en todo τ . Si son iguales en todas partes dentro de una cierta tolerancia, el algoritmo termina.
- Si son distintos, usamos el equilibrio radiativo para estimar las correcciones en $T(\tau)$ para la siguiente iteración. De Ec. 3 tenemos

$$\int_0^\infty \kappa_\nu B_\nu(T + \Delta T) d\nu = \int_0^\infty \kappa_\nu J_\nu d\nu, \quad (41)$$

donde ΔT es la corrección que hay que aplicar al perfil radial en temperatura para hacer calzar el equilibrio radiativo.

- Una expansión en Taylor da:

$$\Delta T(\tau) = \frac{\int_0^\infty d\nu \kappa_\nu(\tau) [J_\nu(\tau) - B_\nu(T(\tau))]}{\int_0^\infty d\nu \kappa_\nu(\tau) \left. \frac{\partial B_\nu}{\partial T} \right|_\tau} \quad (42)$$



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar



Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: caracterización del compañero estelar de baja masa en HD 142527B usando atmósferas BT-SETTL (Christiaens, Casassus et al. 2018, A&A 637, A37):



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo



Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: caracterización del compañero estelar de baja masa en HD 142527B usando atmósferas BT-SETTL (Christiaens, Casassus et al. 2018, A&A 637, A37):



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas



- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: caracterización del compañero estelar de baja masa en HD 142527B usando atmósferas BT-SETTL (Christiaens, Casassus et al. 2018, A&A 637, A37):



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Lineas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: sistema planetario HR 8799 (ESO press release)



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: sistema planetario HR 8799 (ESO press release)



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Lineas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: sistema planetario HR 8799 (Zurlo et al. 2016, 587, A57)



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Lineas estelares

Modelos de atmósferas



Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

3.2- Aplicaciones

- Ejemplo: sistema planetario HR 8799 (Zurlo et al. 2016, 587, A57)



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones


Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar

- Las manchas solares (“sun spots”) corresponden a fenómenos transientes en la fotosfera solar, en los que el campo magnético es más intenso que en promedio, y donde se enfría localmente la fotosfera en regiones por lo general simétricas respecto al ecuador solar. Ejemplo: imagen a 530 nm de DKIST (Hawaii).



- Están relacionadas con la dinamo solar, y también se observan manchas en otras estrellas - oscuras y brillantes.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares



Corona solar

Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar

- El número y distribución de las manchas solares varía en un ciclo de aprox. 11 años, y que se conoce como ciclo solar.

DAILY SUNSPOT AREA AVERAGED OVER INDIVIDUAL SOLAR ROTATIONS



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar

- En la vecindad de las manchas solares, fenómenos de magneto-hydro-dinámica (MHD) en la cromosfera solar (exterior a la fotosfera, $T \sim 4000$ K) conducen a la formación de ‘arcos magnéticos’ (“solar loops”).





Imagen en rayos X a 171 Å.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura

“Limb-darkening”

Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas

Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo

Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar

Vientos de estrellas calientes


Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar

- El cruce de líneas magnéticas libera energía en forma de prominencias solares que alcanzan alturas comparables con el radio solar. Ejemplo: Imagen en He II 304 Å.



- Las prominencias se abren y eyectan material caliente en la coronal, alcanzando temperaturas de $\sim 10^6$ K.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar


Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar

- La luminosidad bolométrica de la corona es solo 10^{-6} del la luminosidad solar, históricamente se observa en luz visible solo en un eclipse solar.
- El tamaño de la corona depende del momento en el ciclo solar.



Eclipse de Putre, 1994 - notar prominencias en rojo ($H\alpha$).



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar
Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar- Eclipse de Hungría, 1999.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas


- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar- Eclipse de Zambia, 2001.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas



- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar- Eclipse de Rapa Nui, 2010.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas


- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar- La Serena, 2019.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas


- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

4.1- Corona solar Pucón, 2020.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones


Coronas y vientos estelares

Corona solar

- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar

Viento solar


Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

4.2- Viento solar



Hale Bopp, 1995.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares



- Corona solar

Viento solar

- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

4.2- Viento solar

- Mediciones satélite de densidad y velocidad en la vecindad terrestre arrojan $n \sim 5 \text{ cm}^{-3}$ y $v \sim 700 \text{ km s}^{-1}$. (IMF = interplanetary magnetic field)
- Estas mediciones arrojan una tasa de pérdida de masa solar de $\dot{M} = 4\pi R^2 n \mu m_H v \sim 10^{-14} M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$.
- La rotación como cuerpo rígido del campo magnético solar, con una velocidad radial \sim constante, genera líneas de flujo en forma de espiral de Arquímedes en el viento solar.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
"Limb-darkening"
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares



Corona solar

Viento solar

Vientos de estrellas calientes
Vientos de estrellas frías

4.2- Viento solar

El viento solar culmina en el “termination shock” al encontrar el medio interestelar.



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- “Limb-darkening”
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares


- Corona solar

Viento solar

- Vientos de estrellas calientes
- Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías


4.3- Vientos de estrellas calientes

- En estrellas más calientes y brillantes que el Sol domina la presión de radiación como mecanismo de aceleración, con una aceleración radial dada por:

$$g_R = \int d\nu \kappa_\nu \frac{1}{c} \vec{F}_\nu \cdot \hat{r}. \quad (43)$$

directamente comparable con la aceleración de gravedad.

- El acoplamiento entre la radiación estelar y el viento se da a través de la absorción de líneas por iones en la cromosfera y corona estelar.
- En una expansión *adiabática*, el viento se hace cada vez más frío a medida que se expande.
- La tasa típica de pérdida de masa es $\dot{M} \sim 10^{-8} M_\odot \text{ yr}^{-1}$.
- Las estrellas calientes con record de pérdida de masa se llaman “estrellas Wolf-Rayet” ($\sim 25 M_\odot$), con $\dot{M} \sim 10^{-6} M_\odot \text{ yr}^{-1}$.



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas

Algoritmo ejemplo
Aplicaciones



Coronas y vientos estelares

Corona solar
Viento solar

Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

4.3- Vientos de estrellas calientes- P Cygni



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones


Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar


Vientos de estrellas calientes

- Vientos de estrellas frías


4.3- Vientos de estrellas calientes- WR 104



Interacting Binary Wind Model
of Spiral Outflow Around WR 104




Periodo ~ 8 meses.



Mas info en

<http://www.physics.usyd.edu.au/~gekko/pinwheel.html>



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares


- Corona solar
- Viento solar

Vientos de estrellas calientes

- Vientos de estrellas frías

Plan

- 1 La atmósfera gris**
 - Perfil radial de temperatura
 - “Limb-darkening”
 - Espectro emergente
- 2 Formación de líneas**
 - Perfiles de líneas
 - Líneas estelares
- 3 Modelos de atmósferas**
 - Algoritmo ejemplo
 - Aplicaciones
- 4 Coronas y vientos estelares**
 - Corona solar
 - Viento solar
 - Vientos de estrellas calientes
 - Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

Perfil radial de temperatura
“Limb-darkening”
Espectro emergente

Formación de líneas

Perfiles de líneas
Líneas estelares

Modelos de atmósferas


Algoritmo ejemplo
Aplicaciones

Coronas y vientos estelares


Corona solar
Viento solar
Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

4.4- Vientos de estrellas frías- U Ant



U Ant: estrella de carbón (“C star” en la AGB, ver Cap. E, $\sim 2 M_{\odot}$) con alta pérdida de mas, $\dot{M}_{\star} \sim 10^{-4} \text{ yr}^{-1}$. Observaciones en CO(1-0) con ALMA (Kerschbaum et al. 2017, A&A, 605, A116). Animación de los mapas en canales de velocidad (channel maps): <https://www.aanda.org/articles/aa/olm/2017/09/aa30665-17/aa30665-17.html>



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- “Limb-darkening”
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Líneas estelares

Modelos de atmósferas



- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías

4.4- Vientos de estrellas frías



La atmósfera gris

- Perfil radial de temperatura
- "Limb-darkening"
- Espectro emergente

Formación de líneas

- Perfiles de líneas
- Lineas estelares

Modelos de atmósferas

- Algoritmo ejemplo
- Aplicaciones

Coronas y vientos estelares

- Corona solar
- Viento solar
- Vientos de estrellas calientes

Vientos de estrellas frías