

(Desarrolle sus respuestas y **cuide la presentación**)

Relaciones útiles:

Distribución binomial y su aproximación para $N \gg 1$ (probabilidad de n eventos con probabilidad p en N experimentos): $P(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} p^n q^{N-n}$, en que $q = 1 - p$, $P(n) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi Npq}} \exp\left[-\frac{(n-Np)^2}{2Npq}\right]$. Distribución Gaussiana: $g(x) \propto \exp\left[-\frac{1}{2}(x - \langle x \rangle)^2 / \sigma^2\right]$, con $\sigma \equiv \sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle}$. Distribución de Maxwell-Boltzmann (densidad de probabilidad): $f(\vec{v}) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} \exp(-av^2)$, $a = \frac{kT}{2m}$. Recurrencia para la integral $I(n) = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx$: $I(n) = \frac{(n-1)}{2\alpha} I(n-2)$, $I(0) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, $I(1) = \frac{1}{2\alpha}$.

I Difusión y marcha aleatoria.

Estudiamos el desplazamiento \vec{R} de una molécula desde el origen del espacio reportado al triedro directo $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$, en el cual no hay dirección preferida. La molécula se desplaza en línea recta hasta chocar con otra molécula, de manera que $\vec{R} = \sum_{i=1}^N \vec{s}_i$ después de N choques.

1. ¿Cuál es el desplazamiento promedio $\langle \vec{s} \rangle$ entre choques? ¿Cuál es el desplazamiento total promedio $\langle \vec{R} \rangle$?
2. Calcule la desviación estandar del desplazamiento de la molécula, $\sigma(\vec{R})$, si el módulo del desplazamiento entre choques es una constante $\|\vec{s}\| = l$ (note que l es, por definición, el libre camino medio).
3. Nos restringimos ahora al caso unidimensional, en el cual la molécula se mueve una distancia l entre choques, hacia $+\hat{x}$ o hacia $-\hat{x}$, con igual probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la molécula a una distancia nl del origen (n natural), después de N choques?
4. Use el teorema de equipartición para estimar el tiempo promedio τ entre colisiones en función de l y de la masa m y temperatura T de la molécula.
5. ¿Cuál es el número de choques que ocurren en un tiempo t , suponiendo que $\vec{R} = 0$ en $t = 0$? Si $t \gg \tau$, escriba una expresión para la probabilidad $P(x, t)$ de encontrar la molécula en la coordenada x , después de un tiempo t (aproxime la probabilidad obtenida en el punto 3 por una probabilidad continua).
6. Demuestre que $P(x, t)$ es solución de la ecuación de difusión 1D,

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

e identifique el coeficiente de difusión D en función de l y τ .

II Caidas de temperatura y de presión por efusión

Un astronauta se encuentra realizando una caminata espacial cuando un pedazo de chatarra espacial percute su casco. El astronauta está amenazado por barotrauma, hipotermia, y asfixia, y quiere calcular cuánto tiempo tiene para regresar a la nave y así evaluar si aun puede terminar su misión. Tiene que calcular la evolución temporal de la temperatura y de la presión de un gas ideal que tiene pérdidas por efusión en el vacío.

Consideramos un recipiente de volumen V , conteniendo N partículas de gas ideal, las cuales pueden escapar por una perforación de área A .

1. 2 pt En una primera aproximación supondremos que la efusión es isotérmica, $T = T_0$, en que $T_0 = T(t = 0)$, en el momento de la perforación.
 - a) Muestre que el número de partículas que se escapan por unidad de area y tiempo es: $\frac{dN}{Adt} = -n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}$, en que $n = N/V$.
 - b) Muestre que $N(t) = N_0 \exp \left[-\frac{A}{V} \sqrt{\frac{kT_0}{2\pi m}} t \right]$.
2. 2 pt Ahora tomamos en cuenta las pérdidas de energía interna, $U = 3/2NkT$, y la consecuente caída de temperatura.
 - a) Siguiendo un razonamiento análogo al que le llevó al resultado del Pto. 1a, considere que para cada partícula que escapa la energía interna disminuye en $\frac{1}{2}mv^2$, y muestre que: $\frac{dU}{Adt} = -n \sqrt{\frac{2}{\pi m}} (kT)^{3/2}$.
 - b) Calcule $\frac{dU}{dt} \left(\frac{dT}{dt}, \frac{dN}{dt} \right)$, y sustituya dN/dt del Pto. 1a para obtener una ecuación diferencial para $T(t)$.
 - c) Muestre que $T(t) = T_0 \chi^{-2}$, en que $\chi(t) = \left[1 + \sqrt{\frac{kT_0}{8\pi m}} \frac{A}{3V} t \right]$.
 - d) Vuelva a usar dN/dt del Pto. 1a para mostrar que $N(t) = N_0 \chi^{-6}$.
 - e) Muestre que $P(t) = P_0 \chi^{-8}$.
3. 2 pt Use la figura adjunta, (calculadas para el aire, con $A = 1 \text{ mm}^2$ y $V = 1 \text{ m}^3$) para responder las siguientes preguntas:
 - a) ¿Qué opina de la aproximación isoterma? Compare dN/dt de los Ptos 1b y 2d y demuestre que el error implicado en la aproximación es de orden $(A/V)^2$. Cuantifique la calidad de la aproximación calculando $(N_t - N_t^{\text{isotermal}})/N_t$ para $A/V \ll 1$.
 - b) Las asfixia ocurre cuando $P/P_0 \approx 1/4$, la hipotermia cuando $T \approx -50 \text{ }^\circ\text{C}$ por más de 10 mn. Para estimar la caída de presión maxima que puede aguantar el astronauta considere que los buses deben ascender no mas de 10 m en 1 mn para evitar el barotrauma, y use el hecho que la presión en el oceano incrementa en 1 atm cada 10 m de profundidad.
 - 1) Determine cuanto tiempo tiene el astronauta para regresar a la nave.
 - 2) ¿A partir de que apertura A el barotrauma es el peligro más inminente que aflige al astronauta? (ayuda: calcule dP/dt , vea que crece monótonicamente en el tiempo, y estime $\sqrt{\frac{kT_0}{8\pi m}}$ usando la figura adjunta.).

